Sensitest:

Ten test identifikuje alergiczne przeciwciała klasy IgE oraz IgG przeciwko różnym alergenom pokarmowym.

Kot	Pies
Wołowina	Wołowina
Jagnięcina	Jagnięcina
Kurczak	Kurczak
Indyk	Indyk
Kaczka	Kaczka
Soja	Soja
Pszenica	Pszenica
Zboże	Zboże
Ryż	Ryż
Jaja	Jaja
Mleko	Mleko
Wieprzowina	Wieprzowina
Łosoś	Jęczmień
Tuńczyk	Ziemniaki
Morszczuk	Owies
Królik	Ryby

Próbka materiału do przeprowadzenia testów alergicznych:
1.0 ml surowicy



LABOKLIN
Polska Sp. z o.o.

www.LABOKLIN.com

LABOR FÜR KLINISCHE DIAGNOSTIK GMBH & CO.KG

PL Warszawa • 01-495 • Powstańców Śląskich 101
tel. 022/691 93 10..11..12 • tel/fax. 022/691 92 92
e-mail: lab.warszawa@laboklin.pl • www.laboklin.pl

PL Opole • 45-517 • Obrońców Stalingradu 66 pok. 200A
VETEXPRESS
tel. 077/423 04 72 • fax 077/423 04 73
e-mail: lab.opole@laboklin.pl • www.laboklin.pl

D Bad Kissingen • D-97688 • Steubenstraße 4
tel. +49-971/72020 • fax +49-971/68546
e-mail: info@laboklin.de • www.laboklin.de

LABOKLIN
Polska Sp. z o.o.

Alergie

Test przesiewowy

Test przesiewowy (technologia receptora Fcε) mierzy poziom specyficznych przeciwciał alergicznych (IgE) przeciwko 4 grupom alergenów: roztocza (kurz domowy), pyłki kwiatowe (trawy, zioła i pyłki drzew), spory grzybów i ślina pcheł. W przypadku pozytywnego wyniku testu zalecamy w połączeniu z historią choroby i objawami dalsze różnicowanie konkretnych alergenów (alergeny sezonowe i całoroczne).

pyłki

ślina pcheł

spory grzybów roztocza

Test główny: Alergeny sezonowe

Test receptora Fcε mierzy poziom specificznych przeciwciał alergenów IgE przeciwko alergenom sezonowym.

Trawy i zioła: mieszanka 6 rodzajów traw*, żyto, bylica pospolita, babka lancetowata,pokrzywa zwyczajna, szczaw polny. Drzewa: Brzoza, Wierzba.
*(Kupkówka, Tymotka łąkowa, Życica trwała, Kostrzewa łąkowa, Wiechlina łąkowa, Kłosówka wełnista)

Test główny: Pióra/Włosy/Łupież

Test receptora Fcε mierzy poziom specificznych przeciwciał alergenów IgE przeciwko różnym alergenom zwierząt domowych: Kot,Pies,Królik, Świnka morska, Papuga, Mieszanka pierza.

Test główny: Całoroczne alergeny

Test receptora Fcε mierzy poziom specyficznych przeciwciał alergenów IgE przeciwko alergenom całorocznym.

Spory grzybów: Alternaria alternata, Apergillus fumigatus, Cladosporium sp., Penicillium sp.
Roztocza kurzu domowego: Dermato-phagoides farinae, Dermatophagoides pteronyssinus.
Inne roztocza: Acarus siro, Tyrophagus putrescens.

Test główny: Owady

Test ten mierzy poziom specificznych przeciwciał alergenów IgE przeciwko owadom.

Simulium (meszka), Culex tarsalis (komar), Tabanus (bąk), Stomoxys (bolimuszka), muchówka.

Immunoterapia specyficzna (SIT)

Ten wyciąg z alergenów jest produkowany w oparciu o wyniki badania testów receptora Fcε* i wymaga recepty od lekarza weterynarii.

Zestaw startowy:
Zawiera 2 fiolki z różnym stężeniem i starcza na około 5 miesięcy terapii.

Zestaw uzupełniający:
Zawiera jedną fiolkę z najwyższym stężeniem alergenów i wystarcza w zależności od indywidualnych przerw we wstrzykiwaniu na około 6 miesięcy.

* jest również możliwe zamówienie SIT na podstawie innych wyników alergicznych